

Objektyp: **Abstract**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **32 (1986)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SOME CHARACTERIZATIONS OF COXETER GROUPS

by Vinay V. DEODHAR ¹⁾

ABSTRACT: The aim of this note is to compile together various characterizations of Coxeter groups. Some of these are well-known, some are not-so-well-known and some are entirely new. The motivation behind the new ones is explained in the introduction.

§ 1. INTRODUCTION

Coxeter groups originally arose as group of symmetries of various geometrical objects. These became the center of activity in Lie Theory because of fundamental work of E. Cartan, H. Weyl and others regarding the structure of semi-simple Lie algebras. A little later on, Coxeter gave a complete classification of finite groups generated by reflections which included the Weyl groups, the dihedral groups and two sporadic groups (H_3 and H_4). In doing so, he gave a presentation of these groups which then led to other families of groups which have similar presentations. These include the affine Weyl groups and this is motivation enough to develop the theory of general Coxeter groups. Such a study was initiated around late 60's and an important characterization in terms of the so-called exchange condition was given (cf. [B], [S]). In recent years, this theory has been further developed and a lot of important work has been done. A major part of this work is in connection with the Bruhat ordering and its role in various different contexts in Lie theory ([K-L]). Another object under investigation is the so-called root-system of a general Coxeter group. It is seen that a number of properties of Coxeter groups can be derived using these root-systems ([D]). In an attempt to understand the role of the above two concepts in this theory, the author found out that these two

¹⁾ Partially supported by N.S.F. grant No. 82-00752.