

Exercices.

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **9 (1907)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

4° Si $p = 4 + 1$, p a $\frac{p-1}{4}$ résidus biquadratiques (n° 4, VII).

5° Si $p = 8 + 1$, -1 est résidu biquadratique, ainsi que 4 et -4 (id.).

6° On démontre comme au n° précédent que, pour $p = 4 + 1$, la congruence des résidus biquadratiques est $x^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1$, et, de là, que les $p - 1$ premiers entiers se partagent en quatre classes d'un nombre égal de termes, qui sont les racines des quatre congruences

$$x^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1, \quad x^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm f.$$

EXERCICES.

1. Etant donné le théorème de Fermat, si on appelle résidus et non-résidus de p les nombres qui lui sont inférieurs et qui donnent respectivement $r^m \equiv 1$ et $\rho^m \equiv -1$, on a les propositions suivantes :

Le produit de deux résidus ou de deux non-résidus est congru à un résidu et celui d'un résidu par un non-résidu l'est à un non-résidu.

Le nombre p a m résidus et m non-résidus¹.

Les résidus sont les restes de la division par p des m premiers carrés.

2. Si $p = 4 + 1$ divise $a^2 \pm kb^2$, il divise aussi $x^2 \mp ky^2$. Quelque soit k , $p = 4 - 1$ divise $x^2 + ky^2$ ou $x^2 - ky^2$. Si p divise $a^2 - kb^2$ et $c^2 - ld^2$, il divise également $x^2 - aly^2$. Si p ne divise ni $x^2 - ky^2$ ni $x^2 - ly^2$, il divise $x^2 - kly^2$. (Lagrange).

3. $B^2 - R$ étant divisible par A et $R - r$ l'étant par p , p divise ou ne divise pas A selon que r est résidu ou non-

¹ Soient n le nombre des résidus et ν celui des non-résidus. Les produits $\rho r, \rho r', \dots$ donneront n non-résidus différents; par suite $n \leq \nu$. La multiplication de ρ par les ν non-résidus donnerait ν résidus différents. Donc $n \leq \nu$ et $n = \nu = m$.

Cette démonstration est beaucoup plus simple que celle de Matrot (J. E. 1893, p. 74).

résidu. Ce théorème sert, dans certains cas, à décomposer les grands nombres en leurs facteurs. (Gauss¹).

4. Le produit des résidus est $\equiv \mp 1$ et celui des non-résidus $\equiv \pm 1$, selon que $p = 4 \pm 1$. De là, le *théorème de Wilson*, que représente la congruence

$$(p - 1)! + 1 \equiv 0,$$

et cette autre congruence, due à Libri,

$$\frac{(p - 1)!}{a} + a^{p-2} \equiv 0.$$

5. Si $p = 4 - 1$, $m! \equiv \pm 1$ selon que p a un nombre impair ou un nombre pair de résidus inférieurs à $\frac{p}{2}$ (Lejeune-Dirichlet).

6. Si $p = 4 + 1$, $(m!)^2 + 1 \equiv 0$ (Lagrange).

7. p divise toujours $rx^2 - r'y^2$ et $\rho x^2 - \rho'y^2$, mais jamais $rx^2 - \rho y^2$. $p = 4 + 1$ divise $rx^2 + \rho y^2$ et non $rx^2 + r'y^2$ ni $\rho x^2 + \rho'y^2$; le contraire a lieu pour $p = 4 - 1$. (Euler).

8. Si $(b^2 - 4ac)$ est résidu, la congruence $ax^2 + bx + c \equiv 0$ a deux racines (Gauss). Plus généralement, la même chose a lieu si $a(b^2 - 4ac)$ est résidu (Cauchy).

9. Si $p = 4 + 1$, on a $(1 + \rho)(1 + \rho') \dots \equiv 2$ et si $p = 4 - 1$, $(1 + r)(1 + r') \dots \equiv 2$ (Stieltjès).

10. Pour $p = 4 + 1$, la suite $1 + \rho, 1 + \rho', \dots$ comprend $\frac{p-1}{4}$ résidus et autant de non-résidus. Si $p = 4 - 1$, la suite $1 + r, 1 + r', \dots$ comprend $\frac{p-3}{4}$ résidus et $\frac{p+1}{4}$ non-résidus (Stieltjès).

¹ Ainsi on a $93019 = 305^2 - 6$; comme le montre la table des résidus, 6 n'est pas résidu des nombres 7, 11, 13, 17, 31, 37, 41, 53, 61, 71, 79, 83: aucun de ces nombres ne divise donc 93019.

Or $2.93019 = 432^2 - 586$. Le reste 11 de la division de 586 par 23 est non-résidu de 23; donc 23 ne divise pas 93019. Le reste 27 de la division de 586 par 43 est de même non-résidu de 43, donc 43 ne divise pas 93019.

$3.93019 = 529^2 - 784 = 529^2 - 28^2 = 501.257$, d'où $93019 = 167.257$, ce qui termine le calcul. Autrement, on continuerait ainsi. $5.93019 = 682^2 - 29$; or 29 n'est résidu d'aucun des nombres 31, 37, 41, 43, 47, 61, 73, 79, 97, ... On déterminerait ainsi successivement d'autres facteurs premiers impossibles à admettre et on n'aurait plus qu'à essayer les divisions par les quelques facteurs inférieurs à $\sqrt{93019}$ qu'on n'aurait pu éliminer.

On voit l'intérêt qu'il y aurait à posséder une table des résidus des nombres premiers jusqu'à 10.000, ou même plus loin, comme le souhaitait Gauss.

11. Si ni $p - 1$ ni m ne sont résidus, il y a au moins un résidu r tel que $-r - 1$ soit également résidu. (Matrot).

12. Appelons *variation* la succession d'un résidu (ou non-résidu) et d'un non-résidu (ou résidu). La suite $1, 2, 3, \dots, p - 1$, présente un nombre pair ou impair de variations selon que $p = 4 \pm 1$. (Stieltjès).

13. Si $p = 4 - 1$, la congruence $x^2 \equiv a$ a les deux racines $x \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}}$; si $p = 8 + 5$ et que $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1$, ses racines sont $x \equiv \pm a^{\frac{p+3}{8}}$ (Legendre).

Si $p = 8 + 5$ et que $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$, les deux racines sont $x \equiv \pm a^{\frac{p+3}{8}} m!$ (Mathews).

14. *Lemme de Gauss*. Soit μ le nombre des restes obtenus en divisant par p les m premiers multiples de a , et ne conservant de ces restes que ceux qui sont plus grands que m ; on a :

$$a^m = (-1)^\mu$$

15. On a aussi, avec Eisenstein,

$$a^m = \prod_{k=1}^m \frac{\sin \frac{2ka\pi}{p}}{\sin \frac{2k\pi}{p}},$$

et avec Liouville,

$$a^m = (-1)^{mn} \prod_{k=1}^n (\alpha^k - \alpha^{-k})^{p-1}.$$

Dans cette dernière formule $a = 2n + 1$ et α désigne une racine imaginaire de l'équation $x^p - 1 = 0$.

16. Le nombre μ est de même parité que le produit

$$\prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{a} \right) \left(\frac{h}{p} + \frac{k}{a} - \frac{1}{2} \right)$$

h variant de 1 à m et k de 1 à $\frac{a-1}{2}$ (Kronecker).

17. Appelons, avec Lagrange, $E\omega$ la partie entière du nombre non entier ω , et posons

$$f(a, b) = E \frac{a}{b} + E \frac{2a}{b} + E \frac{3a}{b} + \dots + E \frac{\frac{b-1}{2} a}{b},$$

$$4r_n = p + \left(4n - p - 2pE \frac{2n}{p}\right) (-1)^{E \frac{2n}{p}},$$

on aura :

$$f(1, b) = 0, \quad f(a + b, b) = \frac{b^2 - 1}{8} + f(a, b) \quad (\text{Tchebichef}).$$

$$r_a \cdot r_{2a} \cdot r_{3a} \dots r_{ma} \equiv a^m m! (-1)^{f(2a, p)} \quad (\text{id.})$$

$$a^m \equiv (-1)^{f(2a, p)} \equiv 2^m (-1)^{f(a+p, p)} \quad (\text{id.})$$

$$a^m \equiv (-1)^{f(a, p)}. \quad (\text{Gauss}).$$

18. Etendre la notion des résidus aux restes de carrés divisés par un nombre composé P. En particulier, si a est résidu de p , il l'est de p^n . Le nombre p^n a mp^n résidus. (Gauss).

Soit le nombre $P = ax^2 + bxy + cy^2$, où x et y sont premiers entre eux ($b^2 - 4ac$) est résidu de P. (Gauss).

A. AUBRY (Beaugency, Loiret).