

2. Invariance conforme des géodésiques isotropes

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **49 (2003)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Nous renvoyons à [Sp] (vol. 3, p. 310) pour une preuve de ce lemme.

Précisons que le cœur de la démonstration du théorème de Liouville réside vraiment dans la première étape, consistant à prouver qu'un difféomorphisme conforme envoie localement les $(n - 1)$ -sphères sur des $(n - 1)$ -sphères. Ce résultat est généralement obtenu par des calculs et il est difficile d'isoler une raison conceptuelle pour laquelle il est vrai. Aussi se propose-t-on de faire le lien entre cette propriété et un résultat profond mais *a priori* sans rapport : l'invariance conforme des géodésiques isotropes en géométrie pseudo-riemannienne ou riemannienne complexe.

Notre preuve s'applique à des transformations conformes analytiques entre ouverts de \mathbf{R}^n . Les preuves classiques (par exemple [M]) requièrent en général une régularité C^3 et on peut trouver dans [H] une preuve plus difficile qui traite le cas des applications de classe C^1 .

2. INVARIANCE CONFORME DES GÉODÉSQUES ISOTROPES

Rappelons qu'une métrique pseudo-riemannienne g sur une variété M est la donnée d'une forme quadratique non dégénérée de signature (p, q) sur chaque espace tangent à M . Nous supposons par la suite que g n'est pas riemannienne, c'est-à-dire que ni p ni q ne sont nuls.

Une géodésique $t \mapsto c(t)$ pour la métrique g est qualifiée d'isotrope si pour tout t où $c(t)$ est défini, on a $g_{c(t)}(c'(t), c'(t)) = 0$. Si l'on se donne une métrique g' dans la classe conforme de g (c'est à dire $g' = e^\sigma g$ pour σ une fonction de M dans \mathbf{R} de même régularité que g), les géodésiques de g' et de g n'ont en général aucun rapport. Néanmoins, on peut montrer le

THÉORÈME 3. *Soit (M, g) une variété pseudo-riemannienne; alors les géodésiques isotropes sont les mêmes, en tant que lieux géométriques, pour toutes les métriques de la classe conforme de g .*

Remarquons que ce théorème ne dit pas que les géodésiques isotropes sont les mêmes en tant que courbes paramétrées.

Preuve. Nous rappelons sommairement comment on peut voir le flot géodésique sur une variété comme un flot hamiltonien (le lecteur souhaitant plus de détails peut se référer à [AM]). On note T^*M le fibré cotangent de M et ω la forme symplectique standard sur T^*M . La donnée d'une

métrique pseudo-riemannienne g sur M fournit en tout point x de M un isomorphisme i_x de T_x^*M dans T_xM . On peut alors associer à la métrique g un Hamiltonien H sur T^*M donné par $H(x, \zeta) = g_x(i_x(\zeta), i_x(\zeta))$, ainsi qu'un gradient symplectique X vérifiant $d_{(x, \zeta)}H(\cdot) = \omega_{(x, \zeta)}(X, \cdot)$. Les projections sur M des trajectoires du flot ϕ^t associé au champ X sont les géodésiques de la métrique g . On peut faire la même construction avec une métrique g' dans la classe conforme de g , et on obtient ainsi un Hamiltonien H' et un gradient symplectique X' . Comme g et g' sont conformément équivalentes, pour tout x dans M et tout ζ dans T_x^*M , les vecteurs $i_x(\zeta)$ et $i'_x(\zeta)$ sont colinéaires, et par conséquent, les lieux d'annulation de H et H' sont les mêmes. Ils consistent en une hypersurface singulière $\Sigma_0 \subset T^*M$, qui est laissée invariante par l'action des flots ϕ^t et ϕ'^t . Notons que les points où Σ_0 est régulière sont exactement le complémentaire dans Σ_0 de la section nulle. Maintenant, on remarque qu'en un point (x, ζ) où Σ_0 est régulière, les vecteurs $X(x, \zeta)$ et $X'(x, \zeta)$ sont tous deux orthogonaux, pour la forme ω , à l'espace tangent en (x, ζ) à Σ_0 . Comme ω est non dégénérée et que $T_{(x, \zeta)}\Sigma_0$ est de codimension 1 dans $T_{(x, \zeta)}(T^*M)$, c'est qu'ils sont colinéaires. On en conclut que X et X' sont toujours colinéaires sur Σ_0 puisqu'ils le sont sur un ouvert dense de Σ_0 . Par conséquent, les trajectoires des flots ϕ^t et ϕ'^t sur Σ_0 sont identiques en tant que lieux géométriques, ce qui achève la preuve. \square

En fait, on peut étendre ce théorème à d'autres cadres. Considérons par exemple une variété complexe M munie d'une métrique riemannienne holomorphe g (c'est-à-dire d'un champ holomorphe de formes quadratiques complexes non dégénérées sur M). On peut définir la classe conforme de g comme l'ensemble des métriques de la forme λg avec λ une fonction holomorphe de M dans \mathbf{C} qui ne s'annule pas. Il existe de même une notion de géodésiques pour la métrique g , qui seront des courbes à paramètre complexe $z \mapsto c(z)$. On définit les géodésiques isotropes comme précédemment. Avec ces définitions, la démonstration du théorème 3 s'adapte au cadre complexe et on peut affirmer que les géodésiques isotropes de toutes les métriques de la classe conforme de g sont identiques, en tant que lieux géométriques.

On peut maintenant énoncer le

COROLLAIRE 4. *Une application conforme entre deux variétés pseudo-riemanniennes (resp. entre deux variétés complexes munies de structures riemanniennes holomorphes) M et N envoie les géodésiques isotropes de M sur les géodésiques isotropes de N .*