

Eine räumliche Transformation

Autor(en): **Muggli, H.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik = Revue technique suisse des mensurations et améliorations foncières**

Band (Jahr): **35 (1937)**

Heft 6

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-196655>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

E. Winkler (i. d. Einl. dieses Aufsatzes genau zitierte und hier verarbeitete Abhandlung).

Die Probleme nur im Ueberblick und in Streiflichtern darstellend:

E. Brückner, Die schweizerische Landschaft einst und jetzt.

(Rektoratsrede. XVIII. Jahresb. d. Geogr. Ges. Bern, 1898/99.)

H. Dörries, Zur Entwicklung der Kulturlandschaft im nordostschweizerischen Alpenvorlande.

(Mitteil. d. Geogr. Ges. Hamburg 1928, S. 180/202.)

O. Flückiger, Zur Geographie des Menschen auf dem Boden der Schweiz.

(Beil. z. Progr. d. Höheren Töcherschule Zürich 1910.)

O. Frohn Meyer, Gempfenplateau und unteres Birstal. Eine anthropogeographische Studie auf Grund der Karten und Pläne seit dem 17. Jahrhundert. Dissertation, Basel 1917.

NB. Die Frohn Meyersche Arbeit reiht sich zwischen die von H. Wegelin und die von Ad. Roemer ein.

Eine räumliche Transformation.

Von *H. Muggli*, dipl. Math., Rüschlikon.

Vorbemerkung der Redaktion.

Die Transformation, die in der nachstehend veröffentlichten Arbeit untersucht wird, ist von praktischer Bedeutung bei den stereoskopischen Raumautographen.

Wenn wir in der Luftphotogrammetrie mit derselben photographischen Kammer zeitlich nacheinander zwei Aufnahmen machen und sie nach der Entwicklung in zwei Kammern einlegen, die der Aufnahmekammer identisch sind, und sie in dieselbe gegenseitige Orientierung bringen, die die Aufnahmekammer bei den beiden Aufnahmen hatte, so schneiden sich die je zwei Strahlen, die in jeder der beiden Kammern je einem bestimmten Punkte des Originalgeländes entsprechen. In diesem Falle ist die Transformation des Originalgeländes, das sogenannte „Raummodell“, dem Original ähnlich. Richten wir nun gegen die Kammerobjektive je ein auf unendlich fokussiertes Fernrohr mit den Angularvergrößerungen n_1 respektive n_2 , so daß ihre Achsen in konjugierte und daher sich schneidende Strahlen des Raummodelles fallen, so bilden die Bildstrahlen, die andern konjugierten Punkten des Raummodelles entsprechen, die räumliche Transformation, die in diesem Aufsatz näher untersucht wird. Diese Transformation stellt das dar, was als stereoskopisches Bild der Umgebung des durch die Achsen eingestellten Punktes des Raummodelles durch die sogenannte „geometrische Methode“ entsteht (Vgl. Baeschlin und Zeller, Lehrbuch der Stereophotogrammetrie, Zürich 1934, Seiten 187 und 188). Während bei dieser Transformation die Achsen unverändert bleiben, werden sie in dem praktischen Falle, der bei den Raumautographen verwirklicht wird, gedreht, bis sie parallel sind. Außerdem werden im allgemeinen die transformierten

Büschel um ihre Achsen gedreht, so, daß der Originalstrahl und der transformierte nicht mehr in derselben Ebene liegen.

Der Verfasser der vorliegenden Studie beabsichtigt auch diese allgemeine Transformation zu untersuchen, wenn er dazu die Zeit findet, die ihm seine berufliche Tätigkeit gegenwärtig nicht übrig läßt. Durch die vollständige Untersuchung dieser komplizierteren räumlichen Transformation wird, wie ich glaube, eine wertvolle Bereicherung der Elemente einer Theorie des stereoskopischen Sehens geboten werden können.

F. Baeschlin.

Das geometrische Problem, das in dieser Arbeit behandelt werden soll, läßt sich etwa folgendermaßen formulieren:

Die Punkte Z_1 und Z_2 seien die Träger von je einem räumlichen Strahlbüschel. Jedes Büschel enthalte einen ausgezeichneten Strahl, die Achse des Büschels. Von den beiden Achsen wird vorausgesetzt, daß sie sich in einem Punkt O schneiden. Wir bezeichnen mit p_1 einen beliebigen Strahl des ersten Büschels, mit p_2 einen solchen des zweiten Büschels und mit φ_1 bzw. φ_2 die Winkel zwischen p_1 bzw. p_2 und den zugehörigen Achsen.




Fig. 1

Die beiden Büschel werden nun transformiert, so daß p_1 in p_1' , p_2 in p_2' , φ_1 in φ_1' und φ_2 in φ_2' übergeht. Dabei sollen folgende Gesetze erfüllt sein:

1. Jeder Strahl liege mit seinem transformierten in derselben Ebene.
2.
$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi_1' &= n_1 \operatorname{tg} \varphi_1 \\ \operatorname{tg} \varphi_2' &= n_2 \operatorname{tg} \varphi_2 \end{aligned}$$

Wir betrachten speziell solche Strahlen p_1 und p_2 , die sich in irgend-einem Punkt P des Raumes schneiden. Die transformierten Strahlen p_1' und p_2' werden sich aber im allgemeinen nicht mehr schneiden, d. h. die Transformation der Büschel erzeugt keine Transformation der Punkte des Raumes; es werden vielmehr nur gewisse ausgezeichnete Punkte transformiert.

Welchen Bedingungen müssen die Strahlen p_1 und p_2 bzw. der Punkt P genügen, damit sich die transformierten Strahlen p_1' und p_2' ebenfalls in einem Punkt P' schneiden, und welcher Art ist die Abbildung der Punkte P auf die P' .

Das ebene Problem.

Wir betrachten zunächst nur die Punkte, die in derjenigen Ebene liegen, die durch die beiden Achsen geht. Liegen P und damit p_1 und p_2 in dieser Ebene, so ist das auch der Fall für p_1' und p_2' ; diese schneiden sich also oder sind parallel. P wird daher, wenn man auch unendlich ferne Punkte zuläßt, stets auf einen Punkt P' abgebildet, der ebenfalls in dieser Ebene liegt. Die Abbildung ist ein Spezialfall einer quadratischen Transformation; eine solche führt Gerade im allgemeinen in Kegelschnitte über, welche durch Z_1 und Z_2 gehen. Es würde zu weit führen, diese Abbildung hier zu diskutieren. Man findet sie z. B. behandelt bei Döhlemann, „Geometrische Transformationen“.

Das räumliche Problem.

Wir setzen jetzt voraus, daß die Strahlen p_1 und p_2 nicht in der Ebene liegen, die von den Achsen aufgespannt wird. Trotzdem sollen sich nicht nur p_1 und p_2 , sondern auch ihre transformierten p_1' und p_2' schneiden. Die Schnittpunkte seien wieder P und P' .

Da p_1 und p_1' mit der Achse Z_1O in der selben Ebene liegen sollen, ebenso p_2 und p_2' mit Z_2O , so müssen O , P und P' auf einer Geraden, der Schnittgeraden der beiden Ebenen liegen. h_1 und h_2 seien die Lote von Z_1 und Z_2 auf diese Gerade, q der Abstand der beiden Fußpunkte, α_1 und α_2 die Winkel der Lote mit den zugehörigen Achsen. Aus der Figur liest man folgende Beziehungen ab:

$$(1) \quad \begin{aligned} h_2 \operatorname{tg} (\alpha_2 - \varphi_2) - h_1 \operatorname{tg} (\alpha_1 - \varphi_1) &= q \\ h_2 \operatorname{tg} (\alpha_2 - \varphi_2') - h_1 \operatorname{tg} (\alpha_1 - \varphi_1') &= q \end{aligned}$$

Berücksichtigt man, daß

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi_1' &= n_1 \operatorname{tg} \varphi_1 \\ \operatorname{tg} \varphi_2 &= n_2 \operatorname{tg} \varphi_2 \end{aligned}$$

und setzt man zur Abkürzung

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi_1 &= u; & \operatorname{tg} \varphi_2 &= v \\ h_1 \operatorname{tg} \alpha_2 - h_2 \operatorname{tg} \alpha_1 - q \operatorname{tg} \alpha_1 \operatorname{tg} \alpha_2 &= D, \end{aligned}$$

so erhält man durch Vereinfachung das Gleichungssystem

$$(2) \quad \frac{h_1 u}{\cos^2 \alpha_1} - \frac{h_2 v}{\cos^2 \alpha_2} + D u v = 0$$

$$\frac{n_1 h_1 u}{\cos^2 \alpha_1} - \frac{n_2 h_2 v}{\cos^2 \alpha_2} + n_1 n_2 D u v = 0$$

Es sei vorläufig n_1 verschieden von n_2 . Wir gehen aus von einer beliebigen Geraden durch O (aber nicht in der Ebene der Achsen) und werden zeigen, daß sie außer O noch genau einen ausgezeichneten Punkt enthält. Dazu lösen wir das obige Gleichungssystem nach u auf. Die einzige von Null verschiedene Lösung ($u = 0$ ergibt den Punkt O) ist

$$u = \operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{n_2 - n_1}{n_1 (n_2 - 1)} \cdot \frac{h_2}{D \cos^2 \alpha_2}$$

Berechnen wir noch den Abstand des ausgezeichneten Punktes P von O .

$$\operatorname{tg} (\alpha_1 - \varphi_1) = \frac{n_1 (n_2 - 1) D \cos^2 \alpha_2 \operatorname{tg} \alpha_1 - (n_2 - n_1) h_2}{n_1 (n_2 - 1) D \cos^2 \alpha_2 + \operatorname{tg} \alpha_1 (n_2 - n_1) h_2}$$

$$\begin{aligned} \overline{OP} &= h_1 (\operatorname{tg} \alpha_1 - \operatorname{tg} [\alpha_1 - \varphi_1]) \\ &= h_1 \frac{h_2 (n_2 - n_1) (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha_1)}{n_1 (n_2 - 1) \cos^2 \alpha_2 \cdot D + \operatorname{tg} \alpha_1 (n_2 - n_1) h_2} \end{aligned}$$

Um einen Überblick über alle ausgezeichneten Punkte zu gewinnen, führen wir die Polarkoordinaten r, ϑ, χ_1 und χ_2 ein; und zwar ist $r = OP$, ϑ gleich dem Winkel zwischen OP und der Normalen auf die beiden Achsen, χ_1 bzw. χ_2 gleich dem Winkel zwischen der Normalprojektion von OP auf die Achsenebene und der ersten bzw. der zweiten Achse. Damit ergeben sich die folgenden Beziehungen (s. Fig. 2):

$$\begin{aligned} \sin \alpha_1 &= \sin \vartheta \cos \chi_1 & h_1 &= r_1 \cos \alpha_1 \\ \sin \alpha_2 &= \sin \vartheta \cos \chi_2 & h_2 &= r_2 \cos \alpha_2 \\ q &= r_2 \sin \alpha_2 - r_1 \sin \alpha_1 \\ D &= \frac{r_1 \operatorname{tg} \alpha_2}{\cos \alpha_1} - \frac{r_2 \operatorname{tg} \alpha_1}{\cos \alpha_2} \end{aligned}$$

$$(3) \quad OP = r = \frac{(n_2 - n_1) \cdot r_1 \cdot r_2}{\sin \vartheta [n_1 (n_2 - 1) r_1 \cos \chi_2 - n_2 (n_1 - 1) r_2 \cos \chi_1]}$$

$$\frac{n_2 (n_1 - 1)}{r_1} \cdot r \cdot \cos \chi_1 \cdot \sin \vartheta - \frac{n_1 (n_2 - 1)}{r_2} r \cos \chi_2 \sin \vartheta = n_1 - n_2$$

Ist $n_1 = n_2$, so hat das Gleichungssystem (2) nur dann von O verschiedene Lösungen, wenn $D = 0$ ist; die zweite Gleichung ist dann eine Folge der ersten. In diesem Fall haben wir unendlich viele Lösungen, wobei wir z. B. u beliebig annehmen dürfen. Das bedeutet, daß nur diejenigen Geraden durch O von Null verschiedene ausgezeichnete Punkte enthalten, für die $D = 0$ ist, und daß alle Punkte einer Geraden, für die $D = 0$ ist, ausgezeichnete Punkte sind. Mit unsern Polarkoordinaten erhalten wir die Gleichung:

$$(3') \quad D \cdot \cos \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 = (r_1 \cos \chi_2 - r_2 \cos \chi_1) \sin \vartheta = 0$$




Fig. 2

Ein Punkt ist dann und nur dann ausgezeichnet, wenn seine Koordinaten diese Gleichung befriedigen. (3') ist als Spezialfall in (3) enthalten.

Die Gleichung (3) stellt eine Ebene dar, welche auf der Ebene der Achsen senkrecht steht. Ist $n_1 = n_2$, so geht sie durch O .

Es bleibt noch die Frage nach der Art der Abbildung der Punkte P auf die P' . Die P' liegen in der Ebene, deren Gleichung wir aus (3) erhalten, indem wir dort n_1 durch $\frac{1}{n_1}$ und n_2 durch $\frac{1}{n_2}$ ersetzen.

Die Ebene der P und die der P' schneiden sich in einer Geraden, welche zusammenfällt mit der Schnittgeraden s der beiden Normal-ebenen zu den Achsen in den Punkten Z_1 und Z_2 . Denn für alle Punkte von s ist $\phi_1 = \phi_2 = 90^\circ$ und damit auch $\phi_1' = \phi_2' = 90^\circ$. D. h. die Punkte werden in sich selbst übergeführt.

Die Abbildung der Punkte P auf die P' ist eine Zentralprojektion mit dem Zentrum O ; denn O, P und P' liegen ja auf einer Geraden.

Ist $n_1 = n_2$, so liegen P und P' in derselben Ebene. Die Abbildung ist eine Kollineation mit O als Zentrum und s als Achse. Um das einzusehen, schneiden wir die Strahlen p_1 und p_1' mit der Normalebene zu

Z_1O in O . Wie man aus den Transformationsgesetzen abliest, besteht zwischen den Durchstoßpunkten der p_1 und denjenigen der p_1' eine Ähnlichkeit mit O als Ähnlichkeitszentrum. Durch Zentralprojektion geht eine solche in eine perspektive Kollineation über (Projektionszentrum Z_1).

Schweizerischer Geometerverein.

Protokoll

der XXIII. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 1. Mai 1937
in Yverdon.

Zur ordnungsgemäß einberufenen Delegiertenversammlung haben sich folgende Vertreter der Sektionen und Gruppen eingefunden:

1. Sektionen:

Aargau-Basel-Solothurn:	Hablützel, Basel; Hartmann, Lenzburg.
Bern:	Bangerter, Fraubrunnen; Froidevaux, Biel; Vogel, Lyß.
Freiburg:	Genoud, Châtel-St-Denis.
Genf:	Panchaud, Genf; Baudet M., Genf.
Graubünden:	—
Ostschweiz:	Kundert, St. Gallen; Gsell, Sulgen.
Tessin:	Tosi, Massagno.
Waadt:	Etter, Vevey; Pouly, Lausanne.
Waldstätte:	Widmer, Luzern.
Wallis:	Carrupt, Sierre.
Zürich-Schaffhausen:	Vogel, Pfäffikon; Steinegger, Schaffhausen.

2. Gruppen:

Verband der selbständig praktizierenden Grundbuchgeometer: Schärer, Baden; Werffeli, Effretikon.

Vereinigung der Beamten-Grundbuchgeometer: Lattmann, Zürich.

Vom Zentralvorstand waren Präsident Bertschmann, Zürich, und Kassier Kübler, Bern, anwesend. Ferner wohnte auch der Redaktor der Zeitschrift, Prof. Dr. Baeschlin, Zollikon, der Versammlung bei.

1. *Eröffnung.* Zentralpräsident Bertschmann übernimmt statuten-gemäß den Vorsitz und eröffnet um 11 Uhr die Sitzung mit einem Begrüßungswort. Die Versammlung bestimmt sodann Kassier Kübler zum Protokollführer, Hablützel-Basel und Froidevaux-Biel als Stimmen-zähler und Etter-Vevey als Uebersetzer.

Es wird zur Kenntnis genommen, daß Kollege Panchaud die Lei-tung der Sektion Genf übernommen hat.

2. *Jahresbericht — Jahresrechnung.* Entsprechend der vorgeschlage-nen Tagesordnung wird vorerst das Protokoll der letzten ordentlichen Delegiertenversammlung vom 9. Mai 1936 in Bern, bekanntgegeben in der Juninummer 1936 der Zeitschrift, genehmigt. Sodann findet der Jahresbericht des Präsidenten, publiziert in der Märznummer 1937, die Billigung der Vertreter. Ebenso wird auch der Rechnungsbericht, der ebenfalls der Märznummer beigelegt ist, nach einigen ergänzenden Bemerkungen des Zentralkassiers und Bekanntgabe des Revisions-berichtes, unter Verdankung abgenommen und der Hauptversammlung zur Genehmigung empfohlen. Eine Anregung von Schärer, Baden, betreffend Aenderung der Ausgestaltung des Rechnungsberichtes nimmt der Zentralvorstand zur Prüfung entgegen.

3. *Budget.* Bei der Beratung des Budget begründet Hablützel, Basel, den von der Sektion Aargau-Basel-Solothurn dem Zentral-