

Comment le cerveau digère les traumatismes

Autor(en): **Vahlensieck, Yvonne**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Horizons : le magazine suisse de la recherche scientifique**

Band (Jahr): **31 [i.e. 30] (2018)**

Heft 119: **La métamorphose de la Big science : comment les mégaprojets de recherche se sont ouverts à d'autres disciplines**

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-821661>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Combiner deux médicaments réduit les effets de la méningite


Un tiers des enfants atteints d'une méningite à pneumocoques en meurent dans le monde. Et près de la moitié des survivants gardent des séquelles telles que des troubles auditifs ou des difficultés d'apprentissage. Une nouvelle étude menée à l'Université de Berne sur 180 jeunes rats suscite l'espoir de meilleures thérapies. L'équipe de l'infectiologue Stephen Leib a montré que la maladie évoluait moins gravement chez ces animaux avec une combinaison de deux principes actifs. Elle avait auparavant déjà testé avec succès chacun d'eux séparément.

Le danger particulier de la méningite à pneumocoques provient d'une réaction inflammatoire excessive du corps qui endommage le cerveau. C'est pourquoi les patients adultes reçoivent, en plus d'antibiotiques, des stéroïdes destinés à enrayer la violente réponse du système immunitaire. Mais ceux-ci agissent de manière nocive sur le cerveau de l'enfant, encore en développement.


Le choix de l'antibiotique s'avère décisif. Les substances qui sont normalement prescrites font éclater les bactéries, ce qui exacerbe ainsi la réaction du système immunitaire. L'équipe bernoise a au contraire utilisé de la daptomycine, un antibiotique qui tue les bactéries sans les morceler. L'autre médicament (Cipemastat) empêche les cellules inflammatoires de pénétrer dans le cerveau. Celles-ci ne parviennent dès lors plus à dissoudre la substance particulière qui se trouve entre les cellules, comme elles le font d'habitude en cas d'inflammation.

«Suite à ce résultat positif, une étude de plus grande ampleur a été lancée en France, dans laquelle les médecins traitent des adultes avec la daptomycine», note le responsable de l'étude Stephen Leib. *Alexandra Bröhm*

L. Muri et al.: Combined effect of non-bacteriolytic antibiotic and inhibition of matrix metalloproteinases prevents brain injury and preserves learning, memory and hearing function in experimental paediatric pneumococcal meningitis. *Journal of Neuroinflammation* (2018)



En faisant exploser les bactéries, certains antibiotiques stimulent trop le système immunitaire.



Les souvenirs récents sont stockés dans l'hippocampe, les anciens dans tout le cerveau.

Comment le cerveau digère les traumatismes

Les expériences traumatisantes telles qu'un grave accident ou un viol laissent de profondes traces dans la psyché. En confrontant leurs peurs dans un environnement sécurisant, les victimes peuvent mieux digérer leurs expériences négatives. Mais cette thérapie d'exposition est d'autant moins efficace que le traumatisme est ancien.

Pour étudier l'impact du temps sur la mémoire, une équipe du Brain Mind Institute de l'EPFL a exposé des souris à un électrochoc; elle a ensuite utilisé une protéine de marquage pour déterminer un mois plus tard (une longue période pour les rongeurs) quelles régions du cerveau étaient activées par le souvenir. Résultat: alors que la mémoire récente est localisée uniquement dans l'hippocampe, les souvenirs datant de trente jours sont liés à des signes d'activité supplémentaire situés dans plusieurs structures du cerveau antérieur, en particulier dans le cortex prélimbique. Elles s'activent également lorsque les souris sont soumises à une forme de thérapie d'exposition. «Cela indique que de nombreux parties du cerveau participent à la réécriture d'anciens souvenirs», précise le responsable de l'étude, Johannes Gräff. Il n'existe pas de région unique qui contrôle entièrement la peur. Cette dispersion explique la perte d'efficacité de la thérapie d'exposition.

Le résultat recoupe des observations de patients souffrant de stress post-traumatique dont le cortex prélimbique montre un surcroît d'activité. Johannes Gräff espère que son travail permettra d'améliorer la thérapie des traumatismes: «Nous voulons comprendre comment les mauvaises expériences sont stockées à long terme dans le cerveau. Mais plus encore, comment les modifier.» *Yvonne Vahlensieck*

B. A. Silva et al.: A cFos activation map of remote fear memory attenuation. *Psychopharmacology* (2018)

Des crustacés pour mesurer la qualité des eaux

Malgré les stations d'épuration, des résidus toxiques aboutissent dans les eaux. Ils nuisent aux petits organismes et finissent dans la chaîne alimentaire. Mais ceux-ci peuvent également constituer un indicateur de la pollution, montre une étude de l'institut fédéral de recherche sur l'eau Eawag à Dübendorf.

L'équipe de la chimiste Juliane Hollender a prélevé des échantillons comprenant une centaine de gammarides (des crustacés) en amont et en aval de dix stations d'épuration en Suisse. Elle a ensuite mesuré la concentration en produits toxiques dans ces minuscules crustacés. Résultat: certains produits s'accumulent dans les animaux aux endroits où l'on peut effectivement constater leurs effets nocifs.

Les chercheurs ont identifié 84 substances problématiques dans les gammarides. Les plus fréquentes étaient des antidépresseurs tels que le citalopram et des analgésiques, mais ils ont aussi trouvé des pesticides. «La forte concentration de néocotinoïdes nous a surpris», relève Juliane Hollender. Ces insecticides sont très controversés parce qu'ils nuisent aux abeilles. Très sensibles aux pesticides, les gammarides se prêtent particulièrement bien à ces recherches. «Cependant, contrairement aux médicaments, la plupart des pesticides n'arrivent pas dans les eaux par le biais des stations d'épuration mais directement des champs environnants», explique la chimiste.

En revanche, l'étude a détecté nettement moins de produits toxiques dans l'eau et dans les crustacés autour de la station d'épuration de Bachwis à Herisau (AR). Le processus d'épuration y est complété par un traitement au charbon actif en poudre. Une bonne nouvelle, car ce procédé devrait équiper une centaine de stations d'épuration de Suisse au cours des vingt prochaines années. *Martin Angler*

N. A. Munz et al.: Internal Concentrations in Gammarids Reveal Increased Risk of Organic Micropollutants in Wastewater-Impacted Streams. *Environmental Science & Technology* (2018)



Les gammarides sont très sensibles aux pesticides – et en constituent de bons indicateurs.