

# Kasuistik aus der thierärztlichen Geburtshilfe

Autor(en): **Strebel, M.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **28 (1886)**

Heft 6

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-590845>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Kasuistik aus der thierärztlichen Geburtshülfe.


Von M. Strebel in Freiburg.

### Darm-Becken-Scheidenbruch bei einer Stute. — Bauch-Vertikallage des Fötus.

Eine kraftvolle, gut geformte, etwa 13 Jahre alte, am Ende der Trächtigkeit angelangte Stute war in den letzten Märztagen den ganzen Nachmittag über zum Pflügen gebraucht worden. Kaum am Abend in den Stall zurückgeführt, stellten sich bei ihr alsobald die Geburtswehen ein. Da aber die Geburt stockte, so wollte der in der thierärztlichen Geburtshülfe nicht unbewanderte, intelligente Eigenthümer sich über das vorhandene Geburtshinderniss Aufschluss verschaffen. Nach vorgenommener genauer Untersuchung und mehreren fruchtlosen Lageberichtigungsversuchen des falsch gelagerten Jungen überzeugte er sich bald von der Unmöglichkeit, dasselbe — wenigstens in seiner fehlerhaften Lage — entwickeln zu können; ja er gab, da ihm die Berichtigung der vorhandenen falschen Fötallage als unmöglich vorkam, die Stute verloren, wollte aber dennoch meine Meinung über den eigenthümlichen Geburtsfall vernehmen und liess mich deshalb rufen.

An Ort und Stelle angekommen, fand ich folgenden, gewiss äusserst seltenen komplizirten Geburtsfall vor. Die Stute hatte höchst ungestüme Wehen. Gleich beim Eingehen in die Scheide traf ich mit der Hand an der linken Scheidenwand, etwa 7—8 *cm* vom Wurfe entfernt, auf eine ziemlich umfangreiche, beiläufig suppentellergrosse, kreisförmige, abgeplattete und weich anzufühlende Geschwulst. Ich schenkte dieser — wie ich bald erfahren musste — verhängnissvollen Geschwulst keine weitere Beachtung; ich betrachtete dieselbe als einen geringgradigen, durch das heftige Drängen verursachten Scheidenvorfall. Ich fand den Gebärmutterhals vollkommen eröffnet. Das todte Junge präsentirte sich in der vollkommenen Bauch-Vertikallage. Der Steiss ruhte auf der unteren Uterus(Bauch-)

wand, während der Kopf gegen die Lenden gerichtet war und dieselben mit der Stirnfläche berührte. Der Rücken war dem Gebärmuttergrunde zugekehrt und leicht nach links gerichtet. Die Stellung des Fötus war ganz diejenige eines sitzenden Hundes, dem die beiden Vorderfüsse aufgehoben werden. Die Füße der im Knie leicht gebeugten vorderen Extremitäten drangen etwas in den Beckeneingang ein. Die beiden Hintergliedmassen waren im Kniescheiben- und im Sprunggelenke stark gebeugt und zwar die rechte sehr bedeutend mehr als



die linke. Die Ferse der linken Gliedmasse stiess am vorderen Schambeinrande an; der Fuss ragte in die Geburtswege hinein. Das rechte, einen spitzen Winkel bildende Sprunggelenk lagerte im Beckeneingange; die Ferse drängte stark gegen die linke Beckenwand; Fuss und Schienbein lagen im Uterus (siehe bestehende Zeichnung). Dass der Fötus bei einer solchen Haltung stark eingekeilt war, begreift sich leicht.

In Gegenwart einer derartigen Fötallage schien mir die einzig rationelle Verfahrungsweise, die Lageberichtigung und damit die Entwicklung des Jungen zu ermöglichen, deutlich

angezeigt zu sein. Da die Hintergliedmassen etwas mehr als die vorderen vorlagen und es zudem bei gleichgradigem Vorliegen der Vorder- und Hinterfüsse ungemein viel leichter ist, eine Steiss- als eine Kopfendlage herzustellen, so wollte und musste ich den Fötus in die Steissendlage zu bringen versuchen. Zu diesem Ende musste das Vordertheil des Jungen mehr in den Uterus zurückgebracht werden. Ich legte zuvörderst über der Fessel der beiden Hintergliedmassen Schlingen an. Hierauf gab ich den an der linken Fessel befestigten Strick einem vertrauten Gehilfen in die Hand, mit dem Bemerkens, denselben ohne meinen Befehl ja nicht anzuziehen, sondern sich auf dessen blosses Festhalten zu beschränken. Die rechte Gliedmasse liess ich vor der Hand unberücksichtigt. Kaum war ich aber mit der Hand zum Brusttheil des Jungen gelangt, kaum hatte ich die mir zum Zurückschieben geeignetst scheinende Stelle ausgesucht und nur leicht den Vorderkörper zurückzustossen begonnen, als auch die Stute auf's Ungestümste zu drängen anfang und im gleichen Momente eine Dünndarmschlinge aus dem Wurfe heraustrat. Diese Darmschlinge gehörte der Mutter an und ich glaubte daher, es hätte eine Ruptur des Uterus stattgefunden. Da aber der Gehilfe nicht an dem ergriffenen Stricke gezogen und ich meinerseits nur einen ganz schwachen Druck auf den fötalen Vorderkörper ausgeübt hatte, so konnte ich diesen fatalen Zufall nicht im Geringsten auf Rechnung unserer Manipulationen setzen und war mir überhaupt das Zustandekommen der supponirten Uterusruptur unerklärlich.

Da bei einer solchen Sachlage an eine Rettung der Stute nicht mehr zu denken war, so stund ich vor jedem weiteren Lageberichtigungsversuche ab und rieth zur Schlachtung des Thieres, welchem Rathe auch auf der Stelle nachgekommen wurde.

Die sogleich durch mich vorgenommene Obduktion erzeugte den Fruchthälter intakt; dagegen bestund in der linken Scheidenwand ein Riss und zwar gerade an der Stelle, wo die bereits

signalisirte weiche Geschwulst gessen. Durch diesen Riss war die erwähnte Dünndarmschlinge in die Scheide eingetreten. Diese Scheidengeschwulst, der ich keine grössere Bedeutung beigelegt, erwies sich daher als ein Darm-Becken-Scheidenbruch; die Geschwulst war nämlich durch die Vorlagerung von Dünndarmpartien bedingt gewesen.

Wie war aber die Entstehung eines solchen, gewiss äusserst seltenen, wenigstens bislang meines Wissens nirgends bekannt gegebenen Bruches möglich, d. h. wie konnten sich Darmpartien zwischen Scheide und Beckenwand hindurchdrängen? Ich kann mir diesen Vorgang nur auf folgende Weise erklären: Wie bereits gesagt, war das rechte Sprunggelenk dermassen stark gebeugt, dass es einen spitzen Winkel bildete. Das Fersenbein drängte mit Macht gegen die linke Beckenwand und hatte dabei eine Ruptur des Bauchfelles an der Stelle, wo sich dasselbe von der Scheide umschlägt, verursacht. Nachdem einmal eine solche Bauchfellruptur stattgefunden, drang durch den hierdurch geschaffenen extravaginalem Kanal eine Dünndarmschlinge neben der Scheide nach hinten und erzeugte besagten Darm-Scheidenbruch, dessen Sack dann in Folge des höchst ungestümen Drängens und starken Andrängens der vorgelagerten Darmpartie barst und dadurch dieser den Eintritt in die Scheide gestattete.

---

## Literarische Rundschau.

---

### Ueber den Gebrauch des Mais als Pferdefutter.

Die Frage der Ersetzung des Hafers durch den Gebrauch des Mais bei der Pferdefütterung bildete in der Sitzung vom 26. November 1885 der Zentralgesellschaft der Thierärzte Frankreichs den Gegenstand einer einlässlichen Debatte. Bekanntlich wird seit einiger Zeit der Gebrauch des fettreichen