

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **132 (1990)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische und bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Delivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant :
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE
Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse:
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacilium (natrium monohydratum) 458 mg
Colistinum sulfatum 1 Mio. I.E.
Conserve: Antiox. E 320. Alcohol benzylicus
Excep. ad suspens. oleos. pro vase 10 ml

Art der Anwendung
Die erkrankten Euterventel vor der Behandlung gründlich auswaschen, die Striche säubern und desinfizieren. Den Inhalt eines Injektors pro erkranktes Euterventel durch zwei Stichkanäle ins Euterinnere einbringen.
Wartezeiten (Misch)
Während der Behandlung und 5 Tage danach: Misch (Schweiz: Milchreguliert)
Nicht über 15 C lagern.
Ch.-B. Gebrauchsbeispiel: 1 Injektor bis

Composition
Cloxaciline (sel sodium monohydrate) 458 mg
Sulfate de colistine 1 million I.E.
Conserv. Antiox. E 320. alcool benzyle
Excep. ad suspens. oleos. q.s. ad 10 ml

Mode d'emploi
Après avoir soigneusement vidé le quartier malade, nettoyer et désinfecter le trayon. Introduire le contenu d'un injecteur dans le canal du trayon de chaque quartier à traiter.
Temps d'attente (Misch)
Pendant le traitement et 5 jours après (selon le règlement suisse des livraisons de lait).
Ne pas entreposer au-dessus de 15 °C. Agiter avant l'emploi.
IKS Nr. 42 270316 OCM Nr. 42 270316



virbac

Mammities cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammities, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac

GENTASEPTIN®

ermöglicht dank seiner
spezifischen pharmazeutischen Formulierungen
eine hochwirksame

Mastitis-Retardtherapie

gegen das **gesamte Erregerspektrum** bei
sehr hoher Heilungsrate:

subklinische Mastitiden	92%
klinische Mastitiden	87%
bei S. aureus/Streptokokken sp.	91%
andere Str. (Str. uberis und dysgal.)	87%
Gramnegative (E. coli/Ps. aerug.)	95%
[E. Kleinschroth und J. Deneke 1987]	

OP: GENTASEPTIN Eutersuspension
Injektor à 10 ml
Flasche à 80 ml

Therapie resistenter Endometritiden:

bei A. pyogenes-Endometritis nach **einmaliger**
intrauteriner Applikation im klinischen Test
vollständige Heilung mit **normaler Fertilität**

OP: GENTASEPTIN Metritisinjektor à 150 ml



Chassot

☎ 031 - 53 39 11

Wir informieren Sie gerne!

® Totocillin Der neue 20 ml Injektor

Zur Therapie akuter und chronischer
Euter- und Uterusentzündungen



Besonders Uterusentzündungen sind meistens Mischinfektionen, die bei unbekanntem Erregerspektrum sofortige Behandlung verlangen.

Notwendig ist ein breites Wirkungsspektrum, das grampositive und -negative Keime erfasst. Das Mittel der Wahl: Totocillin im neuen 20-ml-Injektor, im 10-ml-Injektor oder in der 100-ml-Flasche.

Totocillin ist penicillinasefest, hat eine kurze Wartezeit, kann

zur Uterusbehandlung 12 bis 24 Stunden nach dem Besamen (Aströmsche Methode) eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H₂O, entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure, Natriumsalz 1 H₂O, entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

Handelsformen:

- Sch. mit 10 Inj. zu je 20 ml
- Sch. mit 10 Inj. zu je 10 ml
- Flaschen zu 100 ml

Bayer



Generalvertretung Schweiz:

provet Vet.med.
Center

3421 Lyssach bei Burgdorf