

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **142 (2000)**

Heft 6

PDF erstellt am: **18.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Merilym[®]



Le vaccin le plus utilisé en Europe contre la maladie de Lyme-Borreliose chez le chien

Der in Europa am meistens benützte Impfstoff gegen Lyme-Borreliose beim Hund

Il vaccino più utilizzato in Europa contro la malattia di Lyme-Borrelia nei cani



Merilym – Vaccin inactivé et adjuvé de la maladie de Lyme du chien. Suspension injectable. **Composition** – Chaque dose de 1 ml de vaccin contient : Borrelia burgdorferi inactivée, au minimum 330 unités ELISA sur l'animal de laboratoire, Al+++ (sous forme d'hydroxyde) 0,6 mg, Excipient qsp 1 ml. **Indication** – Prévention de la maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi) chez le chien par immunisation active. **Mode d'emploi et posologie** – Voie d'administration : s.c. Dose : 1 ml. Agiter avant l'emploi. **Schéma de vaccination** – **Primovaccination** : 1ère injection : à partir de la 1ème semaine d'âge, 2ème injection : 3 à 5 semaines plus tard. **Rappel** : Annuel, avant la période à risque. En cas de risque important, rappel semestriel. **Contre-indications** – Aucune connue. **Effets secondaires** – Exceptionnellement, la vaccination est susceptible de révéler un état d'hypersensibilité. Instaurer alors un traitement symptomatique. La vaccination peut entraîner une réaction locale transitoire au point d'injection chez certains sujets. **Remarques importantes** – Ne vacciner que des sujets en parfait état de santé et correctement vermifugés 10 jours au moins avant l'intervention. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. **Conservation** – Entre 2°C et 8°C et à l'abri de la lumière. **Présentation** – Flacon de 1 dose. Boîte de 1 ou de 10 flacons.

Merilym – Inaktivierter adjuvierter Lyme-Borreliose-Impfstoff für Hunde. Wässrige Suspension. **Zusammensetzung** – 1 ml Impfstoff enthält : Borrelia burgdorferi inaktiviert, minimal 330 ELISA-Einheiten im Versuchstier gemessen, Al+++ (als Hydroxid) 0,6 mg, Excipient qsp 1 ml. **Indikation** – Aktive Schutzimpfung gesunder Hunde gegen Lyme-Borreliose (Borrelia burgdorferi). **Anwendung und Dosierung** – s.c. Dosierung – 1 ml. Vor Gebrauch schütteln. **Impfschema** – **Erstimpfung** : Erstinjektion: ab einem Alter von 12 Wochen, Nachimpfung : nach 3 bis 5 Wochen. **Wiederholungsimpfungen** : in jährlichem Abstand vor der Zeitspanne besonderer Infektionsgefährdung (Zeckensaison). Bei besonders hoher Infektionsgefährdung halbjährliche Wiederholungsimpfung. **Kontraindikationen** – Keine bekannt. **Nebenwirkungen** – Ausnahmsweise können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die symptomatisch zu behandeln sind. In gewissen Fällen können vorübergehend lokale Reaktionen an der Injektionsstelle auftreten. **Wichtige Hinweise** – Nur gesunde Hunde impfen, die mindestens 10 Tage vor der Impfung korrekt entwurmt wurden. Übliche aseptische Keutelen beachten. **Lagerung** – Zwischen 2°C und 8°C und im Dunkeln aufbewahren. **Handelsform** – Fläschchen zu 1 Dosis. Packung zu 1 oder 10 Fläschchen.

N° VI : 149



Produit par/Hergestellt durch :

Distribué par/Vertrieb durch :



BIOKEMA SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00

www.biokema.ch